

SCHEDA TECNICA

1. NOME COMMERCIALE: **ROACH TAB**

Pastiglia a base alimentare per il monitoraggio di: *Blattella germanica* (Blattella grigia o scarafaggio delle cucine, degli ospedali, etc.), *Blatta orientalis* (Blatta nera o scarafaggio nero delle vecchie abitazioni), *Periplaneta americana* (Blatta rossa) e *Supella longipalpa*.

Monitoring device utile all'applicazione dell'IPM secondo norma UNI EN 16636: 2015, da impiegare per mantenere una regolare sorveglianza degli infestanti presenti in un determinato ambiente per un periodo di tempo definito.

2. CODICE PRODOTTO: **P-01052**

3. IMMAGINE PRODOTTO:



4. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Roach Tab è una pastiglia a base alimentare per blatte che deve essere utilizzata all'interno di una trappola adesiva. Per potenziare l'effetto attrattivo del gel già presente in alcune trappole, si suggerisce l'uso di tale articolo in Geotrap (P-04047), Geotrap Evo (P-04147), Geotrap Mini (P-04094), Geotrap Plastic (P-04002GEL) e Scar4trap (P-04013). Se ne suggerisce l'uso altresì all'interno delle trappole Monitor Guard (P-04081) e 3 Way Trap (P-04031).

Caratteristiche:

- Pastiglia bombata composta da miscela di aromi alimentari ed eccipienti;
- Diametro: 12 mm;
- Peso: 840 mg/ pastiglia.

Misure blister: 95 x 60 mm.

Colore: come da immagine riportata

I prodotti InPEST potrebbero subire, in qualsiasi momento e senza preavviso ai clienti, modifiche tecniche ritenute necessarie od opportune.

SCHEDA TECNICA

5. MODALITA' D'USO:

Collocare Roach Tab (pastiglia a base alimentare per blatte) all'interno delle trappole menzionate, nei seguenti ambienti:

- In prossimità di: quadri elettrici, canaline elettriche, lavastoviglie, lavelli, forni, locali di lievitazione, pedane, motori, scarichi, porte e perimetri, ambienti caldo-umidi in genere, e ovunque si sospetti la presenza di Blatte;
- in aree poco illuminate;
- a pavimento o a parete.

È consigliabile la numerazione della trappola ed il suo posizionamento relativo nella planimetria dell'area monitorata al fine di agevolare il controllo della postazione durante i monitoraggi periodici.

Si suggerisce l'utilizzo di guanti ogni qualvolta si maneggi il prodotto. L'eventuale odore di fumo o altre sostanze sulle mani potrebbe compromettere l'efficacia del prodotto.

Area di copertura teorica: collocare le trappole contenenti la pastiglia a base alimentare per blatte ad una distanza di 3-5 m l'una dall'altra, a seconda del grado di infestazione.

Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l'anno.

Frequenza controlli consigliata: settimanale. Sostituire la pastiglia e la trappola dopo due mesi (massimo) o anticipatamente in relazione alle condizioni di infestazione, della presenza di polveri e di acqua/umidità nell'ambiente.

Condizioni di stoccaggio: Conservare in luogo fresco (a temperature inferiori ai 25 °C) e asciutto (umidità relative inferiori al 55%).

In condizioni ottimali di stoccaggio il prodotto in confezione integra dura 3 anni. Dall'apertura della confezione, l'attrattivo dura 60 giorni.

6. CONFEZIONE E RICAMBI:

- 10 pastiglie per blister;
- Imballi da 200 pezzi (20 blister, unità di vendita).

7. SMALTIMENTO:

Lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione locale, nazionale e/o europea vigente.